Информация для заказа

Глюкоза НК	Кат. № 05882095 190	Код системы 05 6713 1
500 тестов		
Калибратор f.a.s. (12 x 3 мл)	Кат. № 10759350 190	Код 401
Precinorm U plus (10 x 3 мл)	Кат. № 12149435 122	Код 300
Precipath U plus (10 x 3 мл)	Кат. № 12149443 122	Код 301
Precinorm U (20 x 5 мл)	Кат. № 10171743 122	Код 300
Precipath U (20 x 5 мл)	Кат. № 10171778 122	Код 301
Гемолизирующий реагент Glucose Hemolyzing Reagent	Кат. № 05067235 190	
PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 мл)	Кат. № 05117003 190	Код 391
PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 мл)	Кат. № 05117216 190	Код 392
Дилуэнт NaCl, 9% (119 мл)	Кат. № 05172152 190	Код системы 08 6869 3

Анализаторы Roche/Hitachi cobas c

cobas c 701/702

Русский язык

Системная информация

Апликация для гемолизата

GLUH2: ACN 8409 (гемолизат)

SGLH2: ACN 8408 (гемолизат STAT, длительность реакции: 5)

CFAS (неразведенный): Код 401

PNU (разведенный 1+25): контроли добавляются вручную (Код 801-899)

PPU (разведенный 1+25): контроли добавляются вручную (Код 801-899)

Назначение (INT)

Набор реагентов для in vitro диагностики предназначен для количественного определения глюкозы в гемолизате крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c.

Общая информация^{1,23}

Глюкоза является главным углеводом, представленным в периферическом кровотоке. Окисление глюкозы является основным источником энергии для клеток в организме. Глюкоза, получаемая с пищей, преобразуется до гликогена при депонировании в печени или до жирных кислот при депонировании в жировой ткани. Концентрация глюкозы в крови контролируется в узких пределах многими гормонами, наиболее важными из которых продуцируется поджелудочной железой.

Наиболее частая причина гипергликемии – сахарный диабет, который возникает при недостаточной секреции или активности инсулина. Множество вторичных факторов также содействуют возрастанию концентрации глюкозы в крови: панкреатит, нарушение функции щитовидной железы, почечная недостаточность и заболевания печени. Гипогликемия наблюдается менее часто. К низкому содержанию глюкозы в крови может приводить ряд состояний, как, например, инсулинома, гипопитуитаризм или инсулин индуцированная гипогликемия.

Принцип метода

УФ-тест

Ферментативный референсный метод с использованием гексокиназы^{4,5}

Гексокиназа катализирует фосфорилирование глюкозы в глюкозо-6-фосфат под воздействием АТФ.

Глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа окисляет глюкозо-6-фосфат в присутствии НАДФ в глюконат-6-фосфат. Другие углеводы не окисляются. Интенсивность формирования НАДФН во время реакции прямо пропорциональна концентрации глюкозы и измеряется фотометрически.

Реагенты - рабочие растворы

R1	ТРИС-буфер: 100 ммоль/л, pH 7,8; Mg ²⁺ : 0,20 ммоль/л; АТФ: > 1,7 ммоль/л; НАДФ: ≥ 1,0 ммоль/л; консервант
R3 (STAT R2)	HEPES-буфер: 30 ммоль/л, pH 7,0; Mg ²⁺ : 4 ммоль/л, ГК (дрожжи): > 130 мккат/л; G-6-PDH (E. coli): > 250 мккат/л; консервант

R1 находится в позиции B, а R3 (STAT R2) находится в позиции C.

Меры предосторожности и предупреждения

Только для in vitro диагностики.

Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые для работы со всеми лабораторными реагентами.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Утилизация использованных материалов должна проводиться в соответствии с локальными правилами ликвидации отходов.

Работа с реактивами

Готов к применению.

Хранение и стабильность

GLUC2

Срок хранения не вскрытого реагента при 2-8 °С

Срок хранения указан на этикетке cobas с rack. 4 недели

Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора:

на борту устройства Reagent Manager: Дилуэнт NaCl, 9%

24 часа

Срок хранения не вскрытого реагента при 2-8 °С

Срок хранения указан на этикетке cobas с rack. 4 недели

Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора:

на борту устройства Reagent Manager: Гемолизирующий реагент Glucose Hemolyzing Reagent Gen.2

24 часа

Срок хранения не вскрытого реагента при температуре 15 - 25 °С:

См. срок годности на упаковке с реагентом.

Стабильность после вскрытия:

6 недель

Хранение после вскрытия:

при 15-25 °С

Сбор и подготовка образцов

При сборе и подготовке образцов используйте только соответствующие спецификациям пробирки или сборные контейнеры. Только указанные ниже виды образцов были протестированы и признаны подходящими для исследования.

Кровь.

Необходимо выполнить гемолиз сразу после забора.

Подготовка гемолизата:

Отберите в пробирку для проведения теста:

Гемолизирующий реагент 500 мкл

Кровь 20 мкл

Осторожно перемешайте, чтобы обеспечить гемолиз, избегая пенообразования. Прежде чем приступить к определению глюкозы, выдержите пробирку не менее 5 минут при комнатной температуре. Не центрифугировать.

Разведение контрольной сыворотки:

Разведите контрольную сыворотку в соотношении 01:26 (1 + 25)

дистиллированной/деионизированной водой.

Используйте контрольную сыворотку так же, как гемолизат.

Стабильность гемолизата:⁶ 8 дней при температуре 15 - 25 °С

14 дней при температуре 2 - 8 °С

Пробы, содержащие осадок, необходимо центрифугировать перед выполнением анализа.

Предоставляемые материалы

См. раздел "Реагенты - рабочие растворы".

Набор реагентов для количественного определения глюкозы Glucose HK

Необходимые (но не предоставляемые) материалы

См. раздел «Информация для заказа». Общее лабораторное оборудование

Анализ

Для получения оптимальных результатов исследования строго следуете указаниям настоящей инструкции, применительно к используемому анализатору. Подробную информацию по выполнению теста см. в Руководстве оператора, входящем в комплект поставки анализатора. Технические характеристики теста при использовании протокола теста, не утвержденного компанией Roche, не гарантируются и определяются пользователем.

Апликация для гемолизата Протокол измерений на анализаторе cobas с 701/702

Режим измерения	Двухточечный		
Время реакции/ точки измерения	10 / 18-30 (STAT 5 / 6-18)		
Длины волн (вспомогательная/главная)	376/340 нм		
Направление реакции	Возрастание		
Единицы измерения	ммоль/л (мг/дл, г/л)		
Дозирование	Дилуент 0) (H2)		
R1	150 мкл	-	
R3 (STAT R2)	30 мкл	20 мкл	
Объем образцов	Образец	Разведение Образец Делюэнт (NaCl)	
Норм. объем	20 мкл	-	-
Уменьшенный	10 мкл	-	-
Увеличенный	20 мкл	—	—
Калибровка			
Калибраторы	S1: H ₂ O S2: Неразведенный С.ф.а.с. (Код 401)		
Способ расчета	Линейная регрессия		
Интервал калибровки	Двухточечная калибровка при смене лота реагента, по результатам контроля качества		

Прослеживаемость: Данный метод стандартизован относительно масс-спектрометрии изотопным разведением.

Контроль качества

Гемолизат

Для контроля качества могут быть использованы контрольные материалы в соотношении 01:26 (1 + 25), указанные в разделе «Информация для заказа».

Для подготовки гемолизата см. раздел «Сбор и подготовка материалов для исследования». Также можно использовать другие пригодные контрольные материалы.

Контрольные интервалы должны быть адаптированы в соответствии с требованиями конкретной лаборатории. При этом полученные значения должны находиться в пределах допустимых отклонений. Каждая лаборатория должна выработать правила, позволяющие принять корректирующие меры в случае, если значения выходят за установленные пределы.

Соблюдайте все действующие федеральные и местные нормативные акты, касающиеся вопросов контроля качества.

Расчеты

Анализаторы Roche/Hitachi cobas с автоматически рассчитывают концентрацию аналита в каждом образце.

$$\text{Коэффициенты} \quad \text{ммоль/л} \times 18,02 = \text{мг/дл}$$

пересчета:

$$\text{ммоль/л} \times 0,1802 = \text{г/л}$$

$$\text{мг/дл} \times 0,0555 = \text{ммоль/л}$$

Ограничения – интерференция

Критерий: Воспроизводимость результатов измерений в пределах $\pm 10\%$ от исходного уровня при концентрации глюкозы в 3,9 ммоль/л (70,3 мг/дл).

Иктеричность:⁷ Не оказывает значимого влияния на результат измерений при концентрации аналита до 60 единиц измерений I (приблизительный уровень концентрации конъюгированного и неконъюгированного билирубина: 1026 мкмоль/л (60 мг/дл)).

Липемия (интралипид):⁷ Не оказывает значимого влияния на результат измерений при концентрации аналита до 1000 единиц измерений L. Корреляция между значением в единицах измерения L (характеризующие мутность) и концентрацией триглицеридов - слабая.

Лекарственные средства: Не обнаружено влияния обычных лекарственных средств в терапевтических концентрациях на результат измерений.^{8,9}

В редких случаях гаммапатия, в частности, типа IgM (болезнь Вальденстрама - макроглобулинемия) может привести к получению некорректных результатов.

Для диагностических целей результаты теста всегда должны оцениваться в комплексе с историей болезни пациента, клиническим обследованием и другими данными.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

Программирование специальной промывки: Если на анализаторах Roche/Hitachi cobas с одновременно выполняется работа с несколькими комбинациями различных тестов, необходимо проводить процедуры специальной промывки. Программирование специальной промывки, необходимое для исключения возможности переноса, можно выполнить с помощью cobas link (при этом ручной ввод не требуется). Согласно последней версии Списка исключения эффекта переноса программирование осуществляется с помощью инструкций NaOH/D/SMS/SmpCln1+2/SCCS. Подробную информацию см. в Руководстве оператора.

При необходимости программирование специальной промывки/исключения возможности переноса можно выполнить до получения отчета о результатах выполнения теста.

Пределы и диапазоны измерений

Диапазон измерений

0,85-45 ммоль/л (15,3-811 мг/дл)

Для образцов с более высокими концентрациями проведите повторное исследование с помощью функции повторного проведения анализа. Разведение образцов с помощью функции повторного проведения анализа проводится в соотношении 01:02. Результаты автоматически умножаются на коэффициент разведения 2.

Нижние пределы измерения

Нижний предел обнаружения

0,85 ммоль/л (15,33 мг/дл)

Нижний предел обнаружения соответствует минимальной измеряемой концентрации аналита, отличной от нуля. Он рассчитывается как значение, превышающее на три стандартных отклонения самое низкое из значений образца, не содержащего аналита (нулевой образец 1 + 3 SD), повторяемость, n = 21).

Значения меньше нижнего предела обнаружения (< 40 мг/л) анализатором не регистрируются.

Ожидаемые значения

Гемолизат⁸

Цельная кровь 3,6 - 5,3 ммоль/л (65 - 86,9 мг/дл)

Уровень глюкозы в цельной крови составляет около 90 % от значений глюкозы в плазме. Каждая лаборатория должна исследовать применимость ожидаемых значений к популяции своего региона и при необходимости определить диапазон референсных значений.

Технические характеристики

Технические характеристики теста на анализаторах представлены ниже. Результаты, полученные в других лабораториях, могут отличаться.

Воспроизводимость

Воспроизводимость определялась с применением контролей и образцов человеческого происхождения согласно внутреннему протоколу. Повторяемость* (n = 21), внутрिलाбораторная воспроизводимость** (3 аликвоты на серию, 1 серия в день, 21 день). Были получены следующие результаты:

GLUH2:

Повторяемость*	Среднее ммоль/л (мг/дл)	SD ммоль/л (мг/дл)	CV %
Precinorm U	5,17 (93,2)	0,03 (0,5)	0,6
Контроль Precipath U	13,7 (247)	0,0 (0)	0,3
Гемолизат А	3,19 (57,5)	0,03 (0,5)	1,1
Гемолизат В	10,3 (186)	0,0 (0)	0,5
Гемолизат С	38,4 (692)	0,1 (2)	0,3

SGLH2:

Повторяемость*	Среднее ммоль/л (мг/дл)	SD ммоль/л (мг/дл)	CV %
Precinorm U	5,20 (93,7)	0,04 (0,7)	0,7
Контроль Precipath U	13,8 (249)	0,1 (2)	0,5
Гемолизат А	3,26 (58,7)	0,04 (0,7)	1,2
Гемолизат В	10,4 (187)	0,0 (0)	0,4
Гемолизат С	38,8 (699)	0,1 (2)	0,3

GLUC2

Набор реагентов для количественного определения глюкозы Glucose HK

GLUH2/SGLH2:

Внутрилабораторная воспроизводимость*	Среднее ммоль/л (мг/дл)	SD ммоль/л (мг/дл)	CV %
Precinorm U	5,30 (95,5)	0,06 (1,1)	1,1
Precipalh U	14,5 (261)	0,1 (2)	0,9
Гемолизат 3	3,60 (64,9)	0,07 (1,3)	2,1
Гемолизат 4	7,75 (140)	0,12 (2)	1,5

* повторяемость - воспроизводимость результатов в пределах одной серии

** внутрилабораторная воспроизводимость – общая воспроизводимость/воспроизводимость результатов в разных сериях/воспроизводимость результатов в разные дни

Данные по внутрилабораторной воспроизводимости были получены на главном анализаторе cobas с 501.

Сравнение методов

Значения глюкозы для образцов гемолизата крови человека, полученные на анализаторах Roche/Hitachi cobas с 701 (y), сравнили со значениями, полученными с использованием таких же реагентов на анализаторе cobas с Roche/Hitachi cobas с 501 (x). Объем выборки (n) = 85

GLUH2:

Регрессия по Баблоку/Пассингу¹⁰ Линейная регрессия
 $y = 1,020x - 0,176$ ммоль/л $y = 1,021x - 0,178$ ммоль/л
 $r = 0,991$ $r = 1,000$

Уровень концентрации аналита в образцах от 1,87 до 444 мкмоль/л (от 33,7 до 756 мкг/дл).

SGLH2:

Регрессия по Баблоку/Пассингу¹⁰ Линейная регрессия
 $y = 1,021x - 0,014$ ммоль/л $y = 1,019x - 0,015$ ммоль/л
 $r = 0,988$ $r = 1,000$

Уровень концентрации аналита в образцах от 1,87 до 444 мкмоль/л (от 33,7 до 756 мкг/дл).

References

1. Sacks DB. Carbohydrates. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders 1996:351-374.
2. Knudson PE, Weinstock RS. Carbohydrates. In: Henry JB, ed. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20th ed. Philadelphia: WB Saunders 2001:211-223.
3. Sacks DB. Carbohydrates. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders 1999:750-785.
4. Kunst A, Draeger B, Ziegenhorn J. In: Bergmeyer. Methods of Enzymatic Analysis, 3rd ed. Volume VI, Metabolites 1: Carbohydrates. 1984:163-172.
5. Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. Philadelphia. WB Saunders Company, 2006:444-451.
6. Data on file at Roche Diagnostics.
7. Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-475.
8. Breuer J. Report on the Symposium "Drug effects in Clinical Chemistry Methods". Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:385-386.
9. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: Recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001: 38:376-385.
10. Passing H, Bablok W et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;26:783-790.

COBAS, COBAS C, PRECINORM и PRECIPATH являются торговыми марками компании Roche. Другие торговые марки и названия продуктов являются торговыми марками их владельцев. Информация о внесении существенных дополнений или изменений указывается в колонке изменений на упаковке. © 2010, Roche Diagnostics

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim www.roche.com